HUFREHE ?

Was nun ?

Dr. med.vet.Jürg Hugelshofer

HUFKLINIK
das Konzept

AKUT ODER CHRONISCH

Wenn akute Rehesymptome mehr als 72 Stunden andauern (Morrison 2010):
chronisch .

Kommt es durch die akute Hufrehe zur Lageveränderung des Hufbeines
innerhalb der Hufkapsel, spricht man von einer chronischen Hufrehe.

HUFKLINIK
das Konzept

Akute Hufrehe: Symptome

Stellung: sog. Sägebockstellung, Vorhand entlastet, Nachhand belastet.

Gang: Klamm, Wendeschmerz, will kaum gehen
Liegt viel.

Die akute Hufrehe ist immer ein Notfall: nicht lebensbedrohend sondern wegen Folgen: Wenn Hufbein rotiert ist, wird die Abheilungszeit über Monate dauern und Chance für Normalgebrauch nach Abheilung liegt bei weniger als 70%.
Kostenintensive Therapie, Arbeitsausfall.

Akute Hufrehe: Symptome

Erste Therapiemassnahmen, was Sie als HufpflegerIn machen können

- ▣ Notfall! Tierarzt umgehend anfordern.
- ▣ Beine kühlen
- ▣ Weiche nasse Huf-Verbände
- ▣ Liegemöglichkeit auf weichem Untergrund schaffen
- ▣ Sofortige Hufkorrektur, falls Zehen zu lang und Trachten zu hoch:
- ▣ Unterstützung des Strahles (nicht der Trachten)
- ▣ Pferd nicht durch Transporte noch mehr stressen
- ▣ Keine Zwangsbewegung! Falls Pferde liegen, liegen lassen, sofern sie sich selber regelmässig wenden.

Falls keine Besserung nach 24-48 Std.

Nachuntersuchung durch Tierarzt : Hufrentgen,

Falls Hufbein mehr als 2-3 Grad
rotiert ist, Hufkorrektur

Falls nicht rotiert, mit
Hufverband/Gips
Schmerzmitteln und Ruhe
weiterfahren. Nach 2 Tagen
Röntgenkontrolle

Chronische Hufrehe

- ▣ Von aussen nicht erkennbar

Chronische Hufrehe mit Bockhuf

Alte chronische Hufrehe nie richtig korrigiert !

Erste akute Symptome vor ca.12 Monaten,
nie korrekt abgeklärt.

Chronische Hufrehe mit Einschnürung

Rückführung in eine physiologische Hufform

vorher: Rehhuf

Korrektur anhand Röntgenbild und Ausmessen

nachher: korrigierter Huf

HUFKLINIK
das Konzept

Verlauf der Hufreihetherapie

Korrektur

Nach 33 Tagen

Nach 80 Tagen

Nach 6 Monaten

Hufbeindurchbruch was nun?

- ▣ Tierarzt beiziehen, Notfall
- ▣ Huf röntgen lassen :
- ▣ Hufbeinrotation

Sohlendicke: 14.6mm (Pony, 1.48m)

Hufbeinsenkung

Sohlendicke: 4.6mm Pfd: 1.64 m

Hufbeindurchbruch Fall

- ▣ 10 jährige Vollblutstute X, Grösse:1.64m
- ▣ Seit 30 Tagen Hufrehe
- ▣ Röntgen: Rotation, Spitze durchgebrochen

Sohlendicke: 3.77mm

Hufbeindurchbruch Fall

- ▣ Therapie: Hufkorrektur: Zehe kürzen, Trachten kürzen.
- ▣ Hufverband für 10 Tage, dann Beschlag mit
- ▣ abnehmbarem Deckeleisen. Tägliche Wundversorgung. Boxenruhe für 20 Tage.
- ▣ Abheilung der Durchbruchwunde nach 20 Tg.

nach 5 Monaten, 1.10..08

Hufbeindurchbruch Fall

Akut , im Mai

Hufbeindurchbruch

5 Monate später

DIFFERENTIALDIAGNOSE

Hufabszess

Meist einseitiges Vorstellen der betroffenen Gliedmasse
nur zufälligerweise beidseitig
Verschlechtert sich zunehmend
Zangenbefund meist lokal
Hammertest auf Vorderwand
meist negativ , ausser Wandabszess
Anästhesie med.oder lat. Positiv
positiv

Hufrehe

Untertreten der Nachhand in Ruhe,
kann auch einseitig sein
verschlechtert sich zunehmend
meist generalisiert
stark positiv
nur wenn beidseitig anaesthesiert

DIFFERENTIALDIAGNOSE

Beginnende Hufrehe vorne beidseits

DIFFERENTIALDIAGNOSE

Hufabszess vorne rechts

Fragen?

Dr. med.vet.Jürg Hugelshofer
jhugelshofer@bluwin.ch

HUFKLINIK
das Konzept